

3 REKOMENDOWANE NAWYKI

JAK ZAPOBIEGAĆ PRZEBARWIENIOM PODCZAS TERAPII ANTysePTYCZNEJ:



Zawsze stosuj preparaty antyseptyczne zgodnie z zaleceniami lekarza dentysty lub higienistki stomatologicznej. Przestrzegaj wskazanego czasu terapii.



Niektóre pokarmy i napoje mogą nasilać przebarwienia podczas stosowania środków antyseptycznych. Prawidłowe szczotkowanie pomaga usuwać płytkę nazębną i nagromadzony kamień nazębny, które przyczyniają się do powstawania przebarwień.



Stosuj pastę do zębów przeciw przebarwieniom, która pomaga zapobiegać powstawaniu plam. Przed zastosowaniem płynu antyseptycznego przepłucz jamę ustną wodą. Unikaj ściernych past do zębów.

NOWOŚĆ



VITIS
anti-stain

Przestrzeganie terapii antyseptycznej jest naszym priorytetem.

*Zapobiega przebarwieniom
wywołanym przez chlorheksydynę,
jednocześnie łagodna dla dziąseł.*

OBSERWUJ NAS

[instagram.com/vitis_polska](https://www.instagram.com/vitis_polska)



DENTAID
Oral health. Better life.



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
BIS BAŁTYCKI
INSTYTUT
STOMATOLOGII



tel.: 668 687 834
www.dentaidpolska.pl
www.sklep.dentaidpolska.pl

VITIS anti-stain

Przestrzeganie
terapii antyseptycznej
jest naszym
priorytetem



NOWOŚĆ

*Zapobiega
przebarwieniom
wywołanym przez
chlorheksydynę,
jednocześnie
łagodna dla dziąseł*

PRZECIW
PRZEBARWIENIOM

ŁAGODNA
DLA DZIĄSEŁ

ZAPOBIEGA
KAMIENIOWI
NAZĘBNEMU

JESTEŚ W TRAKCIE LECZENIA ANTYSEPTYCZNEGO?

Zapalenie dziąseł wywołane przez płytkę nazębną lub zapalenie dziąseł związane z leczeniem ortodontycznym, w których można zalecić stosowanie środków antyseptycznych.

Zapalenie przyzębia, zapalenie wokół implantów to choroby przewlekłe, które wymagają uzupełniającego leczenia antyseptycznego.

Choroby przyzębia mogą ulegać zaostrzeniu pod wpływem ogólnoustrojowych czynników ryzyka, takich jak **hiperglikemia** (u pacjentów z **cukrzycą**), zaburzenia poziomu hormonów płciowych (w czasie **cięży**) lub przyjmowaniem niektórych **leków**.

- **Przed zabiegiem**, aby zmniejszyć ryzyko infekcji w obszarze zabiegowym i wystąpienia powikłań pooperacyjnych.
- **Po zabiegu**, aby wspomóc higienę jamy ustnej w okresie, gdy jej utrzymanie jest utrudnione.

Obszary jamy ustnej poddane zabiegom antyseptycznym wymagają dodatkowej i spersonalizowanej higieny.

PRZEBARWIENIA: NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCY EFEKT UBOCZNY LECZENIA ANTYSEPTYCZNEGO

Podczas stosowania środków antyseptycznych, takich jak chlorheksydyna czy CPC, na powierzchni zębów mogą pojawiać się przebarwienia.

Na ich powstawanie wpływa wiele czynników, m.in. **palenie tytoniu**, niektóre **leki** oraz spożywanie produktów barwiących, takich jak **kawa**, **herbata** czy **czerwone wino**.



TWÓJ CODZIENNY SPÓSÓB NA OCHRONĘ PRZED PRZEBARWIENIAMI

DO STOSOWANIA PODCZAS LECZENIA PREPARATAMI Z CHLORHEKSYDYNĄ

1 Pierwsza pasta do zębów, która zapobiega powstawaniu przebarwień na powierzchni zębów podczas leczenia antyseptycznego

POTRÓJNE DZIAŁANIE

PRZECIWI
PRZEBARWIENIOM

ŁAGODNA
DLA DZIĄSEŁ

ZAPOBIEGA
KAMIENIOWI
NAZĘBNEMU



01

Zapobiega przed przebarwieniami

02

Działa przeciwpróchniczo

03

Zapobiega gromadzeniu się kamienia nazębnego i pozwala zachować naturalny blask zębów